

Ruhsat Tarih ve No. : 13.02.2018-11059

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR :

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama dozu	Son ilaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Patates	Patates mildiyözü (<i>Pythophthora infestans</i>)	60 g / da	7 gün
Domates (Tarla)	Domates mildiyözü (<i>Pythophthora infestans</i>)	60 g / da	3 gün
Domates (Sera)	Domates mildiyözü (<i>Pythophthora infestans</i>)	60 g / 100 L su	3 gün
Soğan	Soğan mildiyözü (<i>Peronospora destructor</i>)	60 g / da	14 gün

Özellikleri: Carial 43 WG, içerdiği Mandipropamid ve Cymoxanil ile farklı etki mekanizmasına sahip aktif maddeleri sayesinde hastalıklara karşı uzun süreli kalıcı kontrol sağlar. Mandipropamid kısa sürede bitki dokusuna nüfuz ederek translaminar etkisi sayesinde spor çimlenmesinde yüksek etkili olup miselyal gelişme ve sporulasyonu engeller. Cyanoacetamid oxime gurubundan olan Cymoxanil sayesinde ise hem fungal etmenlerin gelişimini önler hem de bir miktar tedavi edici özellik sağlar.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.



Grubu	H5:40	27	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	-------	----	-------------------------

% 25 Mandipropamid + % 18 Cymoxanil

Önce etiketi okuyunuz
Evde kullanmayınız
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Genel Tavsiyeler : Syngenta acil durum numarasını, zehir danışma merkezini ya da doktoru ararken ya da tıbbi müdahale alacağınız zaman ürün ambalajını, etiketini ya da 'ürün Güvenlik Bilgi Formu' nu yanınızda bulundurun.

Soluma durumunda : Hastayı açık havaya çıkarın. Hastayı rahat ve sıcak bir yerde tutun. Soluma düzensiz veya durmuşsa suni solunum yaptırın. Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine ulaşın.

Deri teması durumunda : Derhal bitki koruma ürününün bulaştığı giysileri çıkarın. Temas eden yerleri bol su ile yıkayın. Deri tahriş olmuşsa doktora başvurun. Ürünün bulaştığı giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın.

İÇİNDEKİLER

Mandipropamid
Cymoxanil

ZARARLILIK İŞARETLERİ



Uyarı Kelimesi : TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H302 Yutulması halinde zararlıdır
H361fd Üremeye zarar verme şüphesi var. Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun
P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanın
P301-P312 YUTULDUĞUNDA kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
P308+P313 Maruz kalma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın
P391 Döküntüleri toplayın.
P501 Kabı uygun bir şekilde bertaraf edin
EUH208 Cymoxanil ihtiva eder, alerjik reaksiyon oluşturabilir.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun .

AMBALAJI AÇMADAN ÖNCE EMNİYET TEDBİRLERİNİ OKUYUNUZ

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Carial 43 WG hakkında bir şikâyetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz

Patates – Patates Mildiyösü: Mildiyönün her yıl görüldüğü ve büyük zarar yaptığı üretim alanlarında hastalık belirtileri görülmeden, günlük ortalama sıcaklığı 16 °C bulmasıyla uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmeyen alanlarda ise uygulamaya başlamak için çevrede/tarlada ilk hastalı belirtilerinin görülmesi beklenmelidir.

Domates (Tarla) - Domates Mildiyösü: Domateste; her yıl görüldüğü ve büyük zarar yaptığı üretim alanlarında hastalık belirtileri görülmeden, günlük ortalama sıcaklığı 16 °C ve orantılı nemin en az %80 olması halinde başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmeyen alanlarda ise uygulamaya başlamak için çevrede veya tarlada ilk hastalı belirtilerinin görülmesi beklenmelidir.

Domates (Sera) - Domates Mildiyösü : Domateste; her yıl görüldüğü ve büyük zarar yaptığı üretim alanlarında hastalık belirtileri görülmeden, günlük ortalama sıcaklığı 16 °C ve orantılı nemin en az %80 olması halinde başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmeyen alanlarda ise uygulamaya başlamak için çevrede veya serada ilk hastalı belirtilerinin görülmesi beklenmelidir.

Soğan: Günlük ortalama sıcaklığın 16 °C'ye ulaşması ve orantılı nemin %80'i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de çevrede hastalığın ilk belirtilerinin saptanması ile ilaçlamalara başlanabilir. Hastalık koşullarına ve şiddetine göre 8 -10 gün aralıklar ile devam edilmelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Carial 43 WG etki mekanizmasına göre Grup H5:40 ve 27 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmalarına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için, Carial 43 WG'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını **(3'ten fazla uygulamayı)** aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup H5:40 ve 27 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.



Suda Dağılılabilen Granül (WG)

Grubu	H5:40	27	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	-------	----	-------------------------

% 25 Mandipropamid + % 18 Cymoxanil

Göze teması durumunda: Derhal gözleri, göz kapakları altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lenslerinizi çıkarın. Gerekirse derhal tıbbi yardım alın.

Yutulması durumunda: Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın ve ürünün ambalajını ya da etiketini doktora gösterin. Hastayı kusturmaya ZORLAMAYIN.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

*Balıklara zehirlidir. Ürün artıklarının imhası esnasında sulama veya içmede kullanılan durgun veya akarsu kaynaklarını kirletmeyiniz.

*Artan ürünü usulüne uygun olarak imha ediniz.

*Boş ambalajları başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

*Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile ilaç fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ürünün uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:

Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67 CH-4058

Basel/ İsviçre

ÜRETİM YERİ:

Syngenta Production France S.A.S.
55, rue du Fond du Val, 27600
St.-Pierre La Garanne Fransa

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Halkapınar Mah. 1203/11 Sk.

No: 5-7 İç Kapı No: 62

Konak / İzmir

Tel. : (0232) 413 00 55

Faks: (0232) 435 18 85

®-Syngenta Şirketler Grubunun tescilli ticari markasıdır