

Ruhsat tarih ve no.: 01.05.1997 - 3156

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR :

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Elma	Elma karalekesi (<i>Venturia inaequalis</i>)	40 g / 100 L su	28 gün
Kayısı	Çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i> = <i>Sclerotinia laxa</i>)	30 g / 100 L su	7 gün
Armut	Armut karalekesi (<i>Venturia pirina</i>)	40 g / 100 L su	28 gün
Kiraz / Vişne	Çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i> = <i>Sclerotinia laxa</i>)	30 g / 100 L su	7 gün
Bağ*	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	50 g / 100 L su	7 gün
Şeftali / Nektarin	Çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i> = <i>Sclerotinia laxa</i>)	30 g / 100 L su	7 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. Kayısı, Kiraz/Vişne, Şeftali/Nektarinde bitkinin yaşı ve vejetasyonuna göre 80-100 litre su/da su normunda kullanılmalıdır. Elma, Armut ve Bağda bitkinin yetiştirme özellikleri, yaşı ve vejetasyonuna göre 40-80 l litre su/da su normunda kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. Kayısı, Kiraz/Vişne, Şeftali/Nektarinde bitkinin yaşı ve vejetasyonuna göre 80-100 litre su/da su normunda kullanılmalıdır. Elma, Armut ve Bağda bitkinin yetiştirme özellikleri, yaşı ve vejetasyonuna göre 40-80 l litre su/da su normunda kullanılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ :

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



Grubu	D1 : 9	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	--------	-------------------------

% 50 Cyprodinil

Önce etiketi okuyunuz
Evde kullanmayınız
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Genel Tavsiyeler : Syngenta acil durum numarasını, zehir danışma merkezini ya da doktoru ararken ya da tıbbi müdahale alacağınız zaman ürün ambalajını, etiketini ya da bu Ürün Güvenlik Bilgi Formunu yanınızda bulundurun.

Soluma durumunda : Hastayı açık havaya çıkarın. Hastayı rahat ve sıcak bir yerde tutun. Soluma düzensiz veya durmuşsa suni solunum yaptırın. Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine ulaşın.

Deri teması durumunda : Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkarın. Temas eden yerleri bol su ile yıkayın. Deri tahriş olmuşsa doktora başvurun. İlacın bulaştığı giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın.

İÇİNDEKİLER

Cyprodinil

ZARARLILIK İŞARETİ



Uyarı Kelimesi : DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın
P391 Döküntüleri toplayın.
P501 Kabı uygun bir şekilde bertaraf edin

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun

AMBALAJI AÇMADAN ÖNCE EMNİYET TEDBİRLERİNİ OKUYUNUZ

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

*Balıklara zehirlidir, sulara ve su kaynaklarına bulaştırmayınız.

*Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ :

Chorus 50 WG hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

Bağ-Kurşunu Kuf:

Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde;

- 1. ilaçlama:** Tanelerin olgunluk başlangıcında,
- 2. ve diğer ilaçlamalar:** İlacın etki süresi dikkate alınarak 12-14 gün aralıklar ile yapılmalıdır. Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgelerinde;

- 1. ilaçlama:** Çiçeklenmeden hemen önce,
- 2. ilaçlama:** Kapalı salkım döneminde, 3. ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır. Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

Elma-Karaleke :

- 1. Uygulama :** Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce);
- 2. Uygulama:** Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler kısa saplarıyla ayrı ayrı görüldüğünde);
- 3. Uygulama:** Çiçek taç yaprakları %70-80 döküldüğünde;
- 4.ve diğer uygulamalar :** İklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ilaçların etki süreleri dikkate alınarak 10-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Kayısı-Çiçek Monilyası :

- 1. Uygulama :** Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekteyken),
- 2. Uygulama:** Tam çiçeklenme dönemindeyken (%90-100 çiçekte) yapılır.

Armut-Karaleke:

- 1. Uygulama:** Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce);
- 2. Uygulama:** Beyaz rozet döneminde;
- 3. Uygulama:** Çiçek taç yaprakları % 70-80 döküldüğünde;
- 4.ve diğer uygulamalar** kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak yapılmalıdır.

Kiraz/Vişne-Çiçek Monilyası :

- 1. Uygulama :** Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekteyken),
- 2. Uygulama:** Tam çiçeklenme dönemindeyken (%90-100 çiçekte) yapılır.

Şeftali/Nektarin-Çiçek Monilyası :

- 1. Uygulama :** Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekteyken),
- 2. Uygulama:** Tam çiçeklenme dönemindeyken (%90-100 çiçekte) yapılır.

**Suda dağılılabilen granül (WG)**

Grubu	D1 : 9	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	--------	-------------------------

% 50 Cyprodinil

Göze teması durumunda : Derhal gözleri, göz kapakları altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lenslerinizi çıkarın. Gerekliyse derhal tıbbi yardım alın.
Yutulması durumunda : Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın ve ürünün ambalajını ya da etiketini doktora gösterin. Hastayı kusturmaya ZORLAMAYIN.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ :

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında **4** yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı bitki koruma ürününün uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:

Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67 CH-4058
Basel/ İsviçre

ÜRETİM YERİ:

Exwold Technology Limited
Tofts Farm (East) Industrial Estate
Harlepool, TS25 2BW
İngiltere

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Halkapınar Mah. 1203/11 Sk.
No: 5-7 İç Kapı No: 62
Konak / İzmir
Tel. : (0232) 413 00 55
Faks: (0232) 435 18 85

®-Syngenta Şirketler Grubunun tescilli ticari markasıdır

Bitki tahammülü : Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında tavsiye edildiği kültür bitkileri üzerinde herhangi olumsuz bir etkisi yoktur. Tereddüt halinde, hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Chorus 50 WG isimli Bitki Koruma Ürünü, etki mekanizmasına göre Grup D1:9 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için, Chorus 50 WG'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup D1:9 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU :

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.



Suda dağılabilen granül (WG)

Grubu	D1 : 9	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	--------	-------------------------

% 50 Cyprodinil