


ÇELTİKTE YABANCI OT MÜCADELESİNDE BAŞARININ SIRRI **COUNCIL® SC 300**



*Dirençli darıcan, kız otu,
baraj otu ve biber otuna
karşı güçlü etki*

*Yüksek verimli,
kaliteli ve sürdürülebilir
çeltik üretimi*

*Bayer yabancı ot
uzmanlığını yansıtan yeni ve
modern etki mekanizması*

*İşçilik,
zaman ve maliyet
tasarrufu*

COUNCIL®
SC 300



COUNCIL® SC 300

Çeltik tarlalarında yıllar içinde direnç kazanan darıcan, kız otu, baraj otu ve biber otu gibi yabancı otlarla mücadelede beklediğiniz çözüm sizlerle! Bayer'in yabancı ot çözümleri konusundaki uzmanlığını yansıtan **Council® SC 300**, kontrolü zor yabancı otlara karşı güçlü etki gösterir. İşçilik, zaman ve maliyetten tasarruf sağlarken, hasatta verim ve kaliteyi zirveye taşır!

ÜSTÜN ETKİ ŞEKLİ

- **Council® SC 300**, Tefuryltrione ve Triafamone isimli iki yeni aktif madde ve farklı etki mekanizmasına sahiptir. Çeltik ekiminden sonra, iki uygulama şeklinde kullanıldığında uzun süre yabancı ot kontrolü sağlar.

- Çeltik üretimini severek yapan, ileri teknolojileri takip eden ve akıllı yabancı ot çözümü arayanlar için geliştirilmiş modern bir herbisittir.

- Yabancı otlara karşı güçlü etkisi sayesinde sürdürülebilir çeltik üretiminin kapılarını açar, üreticilerin daha fazla kazanç elde etmelerine olanak sağlar.

COUNCIL® SC 300 KİLİT ÖZELLİKLERİ



EŞSİZ DENEYİM

Bayer yabancı ot uzmanlığını yansıtan iki yeni etki mekanizmasına sahiptir.



DİRENÇ KIRICI

Dirençli darıcan, kız otu, baraj otu ve biber otuna karşı güçlü etki gösterir.



SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM

Yüksek verimli, kaliteli ve sürdürülebilir çeltik üretim imkanı sunar.



UYGUN MALİYET

İşçilik, zaman ve girdi maliyetlerinden tasarruf sağlar.



ÇEVREYE SAYGI

Çevreye, uygulayan kişiye ve bitkiye karşı son derece güvenlidir.

HANGİ YABANCI OTLARA KARŞI ETKİLİ?



Darıcan
(*Echinochloa crus-galli*)



Baraj otu
(*Diplachne fusca*)



Kız otu
(*Cyperus difformis*)



Boğumlu çobandeğneği
(*Polygonum lapathifolium*)

COUNCIL® SC 300 İLE NE KAZANACAKSINIZ?

- Çeltik tarlalarında kontrolü zor dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı **başarılı sonuç** elde edersiniz.
- **Uzun süreli etkisiyle** güçlü yabancı ot kontrolü sağlarsınız.
- **Entegre yabancı ot** yönetimine uyumlu, çevreye ve bitkiye karşı güvenlidir.
- İşçilik ve zamandan tasarruf sağlayarak **daha fazla kazanç elde edersiniz.**
- Mevcut çeltik herbisitlerinin hiçbirisiyle **çapraz direnç göstermez.**

ÇELTİKTE YABANCI OTLARIN DİRENCİNİ KIRAN TEKNOLOJİ

Ürün Grubu : Herbisit
Etkili Madde : Tefuryltrione 200 g/l + Triafamone 100 g/l
Formülasyon : SC (Süspansiyon konsantre)

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu ve zamanı
Çeltik	Kız otu (<i>Cyperus difformis</i>)	Birinci uygulama 40 ml/da, çeltik ekiminden 7-10 gün sonra, çeltiğin ve yabancı otların 1-3 yapraklı döneminde İkinci uygulama 40 ml/da, birinci uygulamadan 7 gün sonra
	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	
	Baraj otu (<i>Leptochloa fusca</i>)	Birinci uygulama 50 ml/da, çeltik ekiminden 7-10 gün sonra, çeltiğin ve yabancı otların 1-3 yapraklı döneminde İkinci uygulama 50 ml/da, birinci uygulamadan 7 gün sonra
	Boğumlu çobandeğneği (<i>Polygonum lapathifolium</i>)	



KALİBRASYON

Uygulama öncesinde kalibrasyon yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde birim alana düşen su miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde yapılmalıdır.



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ

Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için tarlanın tesviyeli olması önemlidir.

- **Birinci uygulama:** Ekimden 7-10 gün sonra tavalardaki su boşaltılmalı, 1-2 gün sonra da ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlamadan 1 gün sonra tavalara su verilmelidir.
- **İkinci uygulama:** Birinci uygulamadan 7-10 gün sonra (ekimden 14-20 gün sonra), aynı şekilde tavalardaki su boşaltılmalı ve 1-2 gün sonra ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlamadan 1 gün sonra tavalara tekrar su verilmelidir.



DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Council® SC 300, etki mekanizmasına göre F2:B2 grubunda yer alan bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip herbisitlerin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimi teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için Council® SC 300'ün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F2:B2 harici) bir herbisit kullanılmasına özen gösteriniz.



KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Direnç yönetimi açısından bazı çeltik herbisitleri ile tank karışımı şeklinde kullanılabilir. Bu karışımları yapmadan önce bir Bayer yetkilisine danışınız.

Uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka ürün etiketini ve ürün bilgilerini okuyunuz.

Bayer Türk Kimya san. Ltd. Şti. / Genel Müdürlük Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:53 Ümraniye 34770 İstanbul

Telefon: 0216 / 528 36 00 Faks: 0216 / 528 38 68 www.cropsscience.bayer.com.tr

Zehirlenme halinde başvurunuz. Ulusal Zehir Merkezi (UZEM): 114

Bütün Zirai mücadele problemlerinizi için firmamıza başvurabilirsiniz. **Bayer TÜRKTED, TSÜAB ve ZİMİD** üyesidir.

FieldView



Kazanlar Kulübü'ne erişmek için 4 Mevsim uygulamasını indirin.

4 Mevsim



Safety Seal



Bayer Website

