

Ruhsat tarih ve no. : 14.06.2022 / 12362

KULLANILACAKI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki adı	Yabancı ot adı	Uygulama Dozu
Buğday, Arpa	Ballıbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>)	350 ml / da Ekim Sonrası Çıkış Öncesi
	Yavşan Otu (<i>Veronica hederifolia</i>) Hakiki papatya (<i>Matricaria chamomilla</i>)	400 ml / da Ekim Sonrası Çıkış Öncesi
	İnce delice (<i>Lolium rigidum</i>) Kısır yabancı yulaf (<i>Avena sterilis</i>)	450 ml / da Ekim Sonrası Çıkış Öncesi
	Yabancı hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	500 ml / da Ekim Sonrası Çıkış Öncesi

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kaptan bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20 - 40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalı, uygulama basıncı 3 atm olarak ayarlanmalıdır. Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesi makinenin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için makinenin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ : İlaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

ÖZELLİKLERİ: Buğday ve Arpa alanlarındaki önemli dar ve geniş yapraklı yabancı otların kontrolünde, çıkış öncesi tavsiye edilen selektif bir yabancı ot ilacıdır. **Prosulfocarb** etkili maddesi, bitki hücresinde lipid biyosentezini engeller. Yaprak ve kökler tarafından alınarak meristematik dokuda gelişmeyi önleyerek etkili olur. Yapraklarda kıvrılmalar görülür. Kök ve sürgün gelişmesi durur. Koleoptillerden yaprak çıkışı olmaz. **S-metolachlor**, çimlenen bitkilerde genel olarak sürgünlerden ve büyüme uçlarından alınarak, hücre bölünmesini engeller.



Grubu	N8	K3	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	----	----	-------------------------------

800 g / L Prosulfocarb + 120 g / L S-metolachlor

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼ 'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:

Genel Tavsiyeler: Syngenta acil durum numarasını, zehir danışma merkezini ya da doktoru ararken ya da tıbbi müdahale alacağınız zaman ürün ambalajını, etiketini ya da ürün Güvenlik Bilgi Formu' nu yanınızda bulundurun.

Soluma durumunda: Hastayı açık havaya çıkarın. Hastayı rahat ve sıcak bir yerde tutun. Soluma düzensiz veya durmuşsa suni solunum yaptırın. Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine ulaşın.

Deri ile teması durumunda: Derhal bitki koruma ürününün bulaştığı giysileri çıkarın. Temas eden yerleri bol su ile yıkayın. Deri tahriş olmuşsa doktora başvurun. Ürünün bulaştığı giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın.

Göze teması durumunda: Derhal gözleri, göz kapakları altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lenslerinizi çıkarın. Gerekirse derhal tıbbi yardım alın.

Yutulması durumunda: Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın ve ürünün ambalajını ya da etiketini doktora gösterin. Hastayı kusturmaya ZORLAMAYIN.

İÇİNDEKİLER:

Prosulfocarb

S-metolachlor

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ : DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçınınız.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz

koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise:

Tıbbi yardım/müdahale alın.

P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve tekrar

kullanmadan önce yıkayın.

P391 Döküntüleri toplayın.

P501 Kabı uygun bir şekilde bertaraf edin

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun

EUH208 (s-metolachlor) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

EUH208 (prosulfocarb) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

AMBALAJI AÇMADAN ÖNCE EMNİYET TEDBİRLERİNİ OKUYUNUZ

KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Uygulama Zamanı: Buğday ve Arpa'nın ekim sonrası; kültür bitkisi ve yabancı otlar çimlenmeden önce toprak yüzeyine dekara 20-40 L su ile pülverize edilerek film tabakası şeklinde uygulanır. Çıkış öncesi kullanılan tüm herbisitlerde olduğu gibi **Ramirus** 'dan beklenen üstün sonuçların alınabilmesi için iyi bir toprak işlemesi yapılmalı, toprak kesek, yabancı ot ihtiva etmemeli ve toprakta yeterli miktarda nem bulunmalıdır.

KISITLAMALAR: Kuru veya yüksek oranda nem ihtiva eden topraklarda, su baskını, don veya yüksek gece-gündüz sıcaklık farklılığının bulunduğu dönemlerde **Ramirus** ile ilaçlama yapmayınız.

Uygulamadan 2 gün sonrasına kadar oluşabilecek şiddetli yağmur (10 mm ve üzeri) veya yoğun salma sulamalardan kaynaklanabilecek taşkınlarda ürün gelişmelerinde olumsuzluklara yol açabileceğinden ve kum içeriğinin %70'i üzerinde olduğu, organik madde içeriği düşük ve fazla kireç oranına sahip topraklarda **Ramirus** uygulanmamalıdır.

BİTKİ TAHAMMÜLÜ:

Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında **Ramirus** ruhsatlı olduğu kültür bitkileri tarafından çok iyi derecede tolere edilir. Doğru ekim tekniklerine uygun olarak Buğday ve Arpa tohumlarının tamamı toprak altında kalacak şekilde (en az 3 cm derinlikte) uygulama yapılması ile ürün güvenliği sağlanmış olur. Ekim sonrası oluşan şiddetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek yüzey akışlarıyla yabancıot kontrolünde düşüşler yaşanabilir.

Münavebe Ürünlerinde Dikkat Edilecek Hususlar:

Buğday ve Arpa ekiminden sonra olası bir olumsuzluk durumunda;

6 Ay sonra Toprak İşleme Yapılmadan (Direkt Ekim); Ayçiçeği, Mısır, Keten, Yulaf, Arpa, Buğday, Kanola, Soya Fasulyesi.

6 Ay sonra Toprak İşleme Yapılarak; Havuç, Marul, Şeker Pancarı, Patates, Yerfıstığı ekilmesi güvenlidir.

Tarla Fasulyesi ve Barbunya uygulamaya müteakip 12 ay sonra ekilebilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Ramirus isimli Bitki Koruma Ürünü, etki mekanizmasına göre Grup N8,K3 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmalarına sahip Bitki Koruma Ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **Ramirus** yerine takip eden sezonda farklı etki mekanizmasına sahip (Grup N8,K3 harici) Bitki Koruma Ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Başka ilaçlarla karışım halinde kullanılması tavsiye edilmez.

syngenta

Ramirus™

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	N8	K3	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	----	----	-------------------------------

800 g / L Prosulfocarb + 120 g / L S-metolachlor

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ :

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

*Balıklara zehirlidir.

*İlaç artıklarını akarsu, göl, havuz sularına ve çeşme yalaklarına bulaştırmayınız.

*Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.

*Boş ilaç ambalajlarını hiçbir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

*İlaç ile çalışırken ağzınızı ve burnunuzu içine alan maske kullanınız.

*Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU :

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :

Kullanıcı, imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez

ÜRETİCİ FİRMA:

Syngenta Crop Protection AG Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel-İsviçre

ÜRETİM TESİSİ:

Nufarm Australia Limited
103-105 Pipe Road
Laverton North VIC 3026
Australia

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Halkapınar Mah. 1203/11 Sk.
No: 5-7 İç Kapı No: 62
Konak / İzmir
Tel. : (0232) 413 00 55
Faks: (0232) 435 18 85

®=Syngenta Şirketler Topluluğunun tescilli ticari markasıdır