Ruhsat tarih ve no.: 10.05.2007 / 5988

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR :

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu
Turunçgiller	Yeşil Küf Çürüklüğü (*Penicillium digitatum*)	200 ml / 100 L su

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ : Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ :

Turunçgillerde yeşil küf çürüklüğü
İlaçlamalar hasattan sonra turunçgil işleme ve paketleme evlerine otomatik özel makinelerle yapılır. Meyveler işleme ve paketleme evlerinde yığın haline getirilecekse 3-4 sıradan fazla yığın yapılmamalı, meyveler hemen kontrol edilerek çürük olanlar ayıklanmalıdır. Ayıklanan meyveler kalibrasyonu yapılmış otomatik özel ilaçlama ünitelerinden 1 dakika süre ile geçirilerek uygulamalar gerçekleştirilir. Uygulamalarda tüm meyve yüzeyinin kaplanmasına dikkat edilmelidir.

Daldırma metodu: Tavsiye dozu üzerinden hazırlanacak olan solüsyona daldırılan portakallar yaklaşık 1 dakika kadar süre ile beklettikten sonra süzdürülüp kurumaları sağlanır, daha sonra depoya alınır.

syngenta

Tecto® 500SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grup	B1:1	Fungisit (Mantar ilacı)

500 g / L Thiabendazole

Önce etiketi okuyunuz
Evde kullanmayınız
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz , içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.
Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼ 'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ
İlacın akut oral ve dermal toksisitesi düşük olmasına rağmen uygulama sırasında normal korunma önlemlerine dikkat edilmelidir. Deri ile temas ettiğinde hafif tahriş görülebilir.

İLKYARDIM TEDBİRLERİ:
Zehirlenme halinde aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız veya hastayı ilaç ambalajı veya etiketi ile birlikte doktora götürünüz.
Genel Tavsiyeler : Syngenta acil durum numarasını, zehir danışma merkezini ya da doktoru ararken ya da tıbbi müdahale alacağınız zaman ürün ambalajını, etiketini ya da bu Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nu yanınızda bulundurun.
Soluma durumunda : Hastayı açık havaya çıkarın. Hastayı rahat ve sıcak bir yerde tutun. Soluma düzensiz veya durmuşsa suni solunum yaptırın.Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine ulaşın.
Deri teması durumunda : Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkarın. Temas eden yerleri bol su ile yıkayın. Deri tahriş olmuşsa doktora başvurun. İlacın bulaştığı giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın.
Göze teması durumunda : Derhal gözleri, göz kapakları altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lenslerinizi çıkarın. Gerekiyorsa derhal tıbbi yardım alın.

İÇİNDEKİLER:
Thiabendazole

ZARARLILIK İŞARETLERİ



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/ spreyini solumaktan kaçının.
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardmı/müdahale alın.
P362 + P364 Bulaşan giysileri çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın
P391 Dökütüleri toplayın.
P501 Kabı uygun bir şekilde bertaraf edin

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
*Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız**.**
***Bütün ilaçlarda olduğu gibi ilaçlama sırasında mümkün olduğunca ilaç ile temastan sakınınız.
*İlaç gözlerinize zarar verebilir.
*Gözünüze geldiğinde hemen yıkayınız.
*İlaç derinize geldiğinde hemen yıkayınız.
*İlaç elbisenize dökülmüş ise hemen değiştirip yıkayınız.
*Arılara zehirlidir.Çiçeklenme zamanı kullanmayın**.**

DEPOLAMA DURUMU VE DİĞER BİLGİLER
Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında **2** yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
Tecto 500 SC isimli Bitki Koruma Ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B1:1 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmalarına sahip Bitki Koruma Ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **Tecto 500 SC** ' nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B1:1) harici Bitki Koruma Ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU :
Kuvvetli alkali ilaçlarla ve Bordo bulamacı ile karıştırılması önerilmez. Geniş ölçekli karışımlardan önce karışım testlerinin yapılması önerilir.

.

syngenta

Tecto® 500SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	**B1,1**	**Fungisit (Mantar ilacı)**

500 g / L Thiabendazole

Yutulması durumunda : Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın ve ürünün ambalajını ya da etiketini doktora gösterin. Hastayı kusturmaya ZORLAMAYIN.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ :
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

FİRMA BEYANI:
Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır.
İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:
Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67 CH-4058
Basel/ İsviçre

ÜRETİM TESİSİ:
Phyteurop SA Rue Pierre
My Z.I. Grande Champagne
F-49260 Montreuil-Bellay France

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:
Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Halkapınar Mah. 1203/11 Sk.
No: 5-7 İç Kapı No: 62
Konak / İzmir
Tel. : (0232) 413 00 55
Faks: (0232) 435 18 85

®-Syngenta Şirketler Grubunun tescilli ticari markasıdır