Ruhsat tarih / No.: 28.12.1999-3701

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU
Bağ	Bağ küllemesi *(Erysiphe necator)*	400 g/ 100 L su
	Bağ yaprak uyuzu *(Colomerus vitis)*	400 g/ 100 L su
Elma	Külleme (*Podosphaera leucotricha, Podosphaera clandestina)*	400 g/ 100 L su
Şeftali	Külleme *(Sphaerotheca pannosa* var. *persicae)*	400 g/ 100 L su
Nektarin	Külleme *(Sphaerotheca pannosa* var. *persicae)*	400 g/ 100 L su
Gül	Külleme *(Sphaerotheca pannosa* var. *rosae)*	400 g/ 100 L su
Begonya	Külleme *(Microsphaera begoniae)*	300-350 g/ 100 L su
Nohut	Antraknoz *(Ascochyta rabiei)*	300 g/ 100 L su
Soğan	Soğan mildiyösü *(Peronospora destructor*)	300 g/ 100 L su
Fasulye	Fasulye pası (*Uromyces appendiculatus*)	300 g/ 100 L su
Hıyar	Kabakgillerde külleme *(Erysiphe cichoracearum, Podosphaera xanthii)*	400 g/ 100 L su
Turunçgil*	Turunçgil kırmızı örümceği *(Panonychus citri)*	600 g/ 100 L su
	Turunçgil tomurcuk akarı *(Aceria sheldoni)*	600 g/ 100 L su

Kükürtlü pestisitlerle kışlık veya yazlık yağ uygulamaları arasında en az 30 gün süre olmalıdır.
Belirli koşullar altında 30 °C üzerinde kullanılması uygun değildir.

***Turunçgilde faydalılara karşı zararsız olduğu tespit edilmiştir.**

syngenta

Thiovit Jet®

Suda Dağılabilen Granül (WG)

Grubu	M2	Fungisit (Mantar ilacı) Akarisit (Kırmızıörümcek ilacı)

%80 Kükürt

Önce etiketi okuyunuz
Evde kullanmayınız
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Büyük miktarlarda yutulduğunda mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, ishal ve uyku hali görülür.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:
Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürün.
Yutulması durumunda hastayı kusturmaya zorlamayın, tıbbi yardım isteyin. Baygın durumdaki hastaya asla ağızdan bir şey verilmemeli, kusturmaya çalışılmamalıdır.
Deriye teması durumunda bulaşık giysileri çıkarın, temas eden yerleri bol su ile yıkayın, bulaşık giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın.

İÇİNDEKİLER
Kükürt

ZARARLILIK İŞARETLERİ



Uyarı Kelimesi : DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ
H315 Cilt tahrişine yol açar
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar

ÖNLEM İFADELERİ
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P210 Isıdan/ kıvılcımdan/ alevden/ sıcak yüzeylerden uzak tutun.-Sigara içilmez.
P264 Elleçlemeden sonra elinizi yüzünüzü sabun ile iyice yıkayın.
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
P280 Koruyucu eldiven /koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE : Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı veya yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P501 Kabı uygun bir şekilde bertaraf edin
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun

AMBALAJI AÇMADAN ÖNCE EMNİYET TEDBİRLERİNİ OKUYUNUZ

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:
Thiovit Jet hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

Bağ – Bağ Küllemesi: 1. Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde, 2.Uygulama: Çiçeklenme öncesi, çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde, 3. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde, 4. ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra, danelere ben düşme dönemine kadar 10-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Bağ Yaprak Uyuzu: İlkbaharda bağda 20-25 asmada yapılan gözlemler sonucu yapraklarda ilk zarar belirtileri saptandığında ilaçlama yapılmalıdır. Genellikle Bağ yaprakuyuzuna karşı özel bir ilaçlama gerekmez. Bağ küllemesine karşı kullanılan kükürt bu zararlıyı da kontrol altında tutar.

Elma – Elma Küllemesi: 1. Uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde, 2. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının %60-70'i döküldüğü dönemde, 3. ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan ürünün etki süresi dikkate alınarak uygulamalara devam edilir.

Şeftali – Nektarin – Külleme: 1. Uygulama: Önceki yıllarda hastalığın yoğunluğuna göre belirlenmelidir. Hastalık, bahçede ilk defa çıkıyorsa belirtiler görülür görülmez uygulamaya başlanır. Önceki yıllarda hastalık görülmüş ise budamadan sonra yapılacak kontrollerde, ağaçlardaki hastalıklı sürgün oranı %3'ü buluyorsa belirtiler görülmeden önce ilk uygulama yapılmalıdır. 2. ve diğer uygulamalar: Bitkinin gelişmesine, kullanılan preparatın etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar uygulamalara devam edilmelidir.

syngenta

Thiovit Jet®

Suda Dağılabilen Granül (WG)

Grubu	**M2**	**Fungisit (Mantar ilacı)** **Akarisit (Kırmızıörümcek ilacı)**

%80 Kükürt

Göze bulaşması durumunda derhal gözleri, göz kapakları altını bol su ile 15 dakika yıkayın. Gerekiyorsa tıbbi yardım alın.
Solunmuşsa temiz havaya çıkartılmalı, nefes alamıyorsa suni solunum yaptırılmalıdır. Derhal tıbbi yardım istenmelidir

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
*Kabakgiller ve kayısı kükürde hassastır bu nedenle kükürt, yağ uygulamalarından en az 30 gün sonra tatbik edilmelidir.
*Atıklarını akarsu, göl, havuz ve çeşme yalaklarına bulaştırmayınız.
*Boş ürün ambalajlarını hiçbir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
*Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında **3** yıl süre ile ilaç fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:
Kullanıcı, imalatçının kontrolu dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ürünün uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA :
Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67 CH-4058 Basel, İsviçre

ÜRETİM TESİSİ:
SYNGENTA Production France S.A.S.
55, rue du Found du Val ,
27600 St. Pierre-La Garenne/France

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:
Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Halkapınar Mah. 1203/11 Sk.
No: 5-7 İç Kapı No: 62
Konak / İzmir
Tel. : (0232) 413 00 55
Faks: (0232) 435 18 85

®-Syngenta Şirketler Grubunun tescilli ticari markasıdır

Gül Küllemesi: Yaprak ve tomurcuk oluşumu başladığında ilk uygulama yapılmalıdır. Uygulama, sabah serinliğinde, rüzgârsız ve yağışsız havalarda yapılmalı ve bitkinin tüm yüzeyi ilaçlanmalıdır. Kullanılan ürünün etki süresi ve hastalığın seyrine göre uygulamalar tekrarlanabilir.

Begonya Küllemesi: Uygulamalara yaprak ve tomurcuk oluşumu başladığında ilk uygulamaya başlanmalıdır. Kullanılan ürünün etki süresi ve hastalığın seyrine göre uygulamalar tekrarlanabilir.

Hıyar – Kabakgillerde Külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C'nin üstünde ve orantılı nemin de %50'nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Soğan – Mildiyö: Günlük ortalama sıcaklığın 16°C'ye ulaşması ve orantılı nemin en az %80'i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile de uygulamalara başlanabilir.

Nohut Antraknozu: Uygulamaya günlük ortalama sıcaklığın 10°C ve orantılı nemin en az %80 olması durumunda başlanması gerekirse de pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtilerinin görülmesi ile de başlanabilir. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış olmuşsa uygulama tekrarlanmalıdır.

Fasulye Pası : Çevredeki fasulye bitkilerinin yapraklarında pas püstüllerinin görülmesinden itibaren uygulamaya başlanmalı ve hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilmelidir. Kuru fasulyede kapsüllerin olgunlaşma döneminde hastalık görüldüğünde ekonomik ürün kayıplarına neden olmadığından uygulamaya gerek yoktur.

Turunçgil – Kırmızıörümcek: İlkbaharda büyüteç ile yaprakların alt ve üst yüzeyindeki hareketli bireyler sayılır. 10 yaprak üzerinde ortalama 4-9 birey varsa ilaçlama yapılmalıdır.

Turunçgil – Tomurcuk akarı: Zararlı ile bulaşık olduğu bilinen bahçelerde, iklim koşullarına göre ilkbaharda sürgünler 8-10 cm ulaştığı dönemde eski gözlerden yeni gözlere geçişin en fazla olduğu Mart sonu Nisan başı ilaçlama yapılır. Birinci ilaçlamayı takiben 25 gün sonra ilaçlamalar tekrarlanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Thiovit Jet isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup M2 (kükürt) olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmalarına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için, Thiovit Jet' in aynı üretim sezonu içinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (M2 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.

syngenta

Thiovit Jet®

Suda Dağılabilen Granül (WG)

Grubu	**M2**	**Fungisit (Mantar ilacı)** **Akarisit (Kırmızıörümcek ilacı)**

%80 Kükürt