




Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu	Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Şeker pancarı	Yaprak Leke Hastalığı *(Cercospora beticola)*	50 ml / da	28 gün

BÖLGE İRTİBAT BİLGİLERİMİZ

GENEL MÜDÜRLÜK
Syngenta Tarım San. ve Tic A.Ş.
Halkapınar Mahallesi 1203/11 Sokak No:5-7
Megapol Çarşı Kule Kat:6 Daire:62
Konak - İzmir
Tel: 0232 413 00 55

Akdeniz Bölgesi
Fener Mah. Falez Cad. No: 20
Lara - Muratpaşa - Antalya
Tel: 0242 329 11 11

Ege Bölgesi
Halkapınar Mahallesi 1203/11 Sokak No:5-7
Megapol Çarşı Kule Kat:6 Daire:62
Konak - İzmir
Tel: 0232 413 00 55

GAP Bölgesi
Şenevler Mahallesi, Orman Yolu Cad. 6108 Sokak Doğa Park Evleri, A Blok No:19/13
Karaköprü - Şanlıurfa
Tel: 0414 316 57 38

Güney Bölgesi
Yeni Mah. 87071 Sok. Bozkurtlar Rezidans No:52 Kat:12 D:25 01200 Seyhan - Adana
Tel: 0322 332 81 00

İç Anadolu Bölgesi
Karaciğan Mah. Ankara Cad. Enntepe Mall Office A Blok Kat:2 Daire:202 Karatay - Konya
Tel: 0534 275 22 43

Karadeniz Bölgesi
Tel: 0530 386 97 04

Marmara Bölgesi
Yavuz Mahallesi Şaraphane Cad.
No:33 Des Ofis Kat: 2 Ofis No:203
Süleymanpaşa - Tekirdağ
Tel: 0282 261 64 00

Amistar® Gold

ŞEKER PANCARINDA

Dıştan İçe Üstün Koruma



Amistar® Gold

syngenta®

© 2024, Syngenta. Her hakkı saklıdır. Bu yayında yer alan bilgiler tescillidir. Hiçbir surette kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. Amistar Gold Tasarım Çerçevesi, Amaç Simgesi, **SYNGENTA** markası, **SYNGENTA** Logosu, Syngenta Grup Şirketlerinden birisinin ticari markasıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA HATTI:114
Syngenta bir ZİMİD üyesidir.

! Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanın.
Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.
Esas olan etiketteki bilgilerdir; resmi tavsiyelere uyunuz.




www.syngenta.com.tr


Syngenta.Turkiye | SyngentaTurkiye | Syngenta TR


®

Litrede 125 g Azoxystrobin ve 125 g Difenoconazole içeriği ile hem koruyucu hem de tedavi edici bir fungisittir. Bu çift yönlü etki mekanizması geniş spektrumlu hastalık kontrolü sağladığı gibi, hem kontak hem de güçlü bir sistemik etki yaratır.

İlaçlama sonrasında bitkinin tüm yeşil aksamlarından bünyesine alınarak; sistemik özelliği sayesinde eşit bir dağılım gösterir. Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes ve Oomycetes fungal etmen gruplarına karşı etkilidir. Antisporulant özelliği, hastalığın bitkide yayılmadan, hızlı bir şekilde kontrol edilmesini sağlar.









2017 yılında Bursa ve Eskişehir'deki teknik demo çalışmalarında, Cercospora yaprak leke hastalığına karşı, Amistar® Gold yaygın olarak kullanılan mevcut pazar standardı ürüne göre en az **%5 daha iyi** hastalık kontrolü sağlamıştır.







Yanda bulunan termal ölçümlerde görüldüğü gibi, Amistar® Gold rakip ilaca göre bitki içinde çok daha hızlı hareket eder ve homojen bir şekilde tüm yaprağa yayılır. Uç kısmından sap kısmına kadar yaprak yüzey alanının tamamında üstün bir şekilde koruma sağlar.

Bu şekilde bitki daha uzun süre korunur ve aynı zamanda daha uzun süre yeşil kalır.

Cercospora hastalığının başlaması için, %90'ın üzerinde nispi nem, 25°C seviyelerinde gündüz sıcaklığı ve 15°C seviyelerinde gece sıcaklığı yeterlidir. Yaprak yüzeyinde ilk lekeler görüldüğünde ilaçlanmaya başlanmalıdır. Çevresel şartlar hastalık için uygun gittiği sürece, hasada 30 gün kalaya kadar 10-14 gün arayla ilaçlamaya devam etmek gerekebilir.

Özellik	Avantajı	Fayda
Çift etki mekanizması	Yüksek performans ve dayanıklılık yönetimi	Hastalığın tüm evrelerinde güvenilir kontrol
Geniş spektrum	Aynı anda birden fazla pancar yaprak hastalıklarına etkili	Tek ürün ile kolay çözüm
Yıkanmaya dayanıklı	Uzun süreli ve iklimsel koşullardan bağımsız devamlı koruma	Esnek kullanım ve kurtarıcı

Amistar® Gold

syngenta®