Ruhsat tarih ve no.: 10.05.2010 – 7712

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR :

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates (Sera)	Patlıcangillerde Külleme *(Leveillula taurica, Oidium lycopersici, Oidium neolycopersici)*	100 ml/100 L su	3 gün
Domates (Tarla)	Erken yaprak yanıklığı (*Alternaria solani)*	60 ml / da	3 gün
	Septorya yaprak lekesi (*Septoria lycopersici)*	60 ml / da	3 gün
	Yaprak küfü (*Cladosporium fulvum*)	60 ml / da	3 gün
Patates	Erken yaprak yanıklığı (*Alternaria solani)*	60 ml / da	14 gün
Patlıcan (Sera)	Patlıcangillerde Külleme *(Leveillula taurica, Oidium lycopersici, Oidium neolycopersici*)	100 ml / 100 L su	3 gün
Patlıcan (Tarla)	Patlıcangillerde Külleme *(Leveillula taurica, Oidium lycopersici, Oidium neolycopersici*)	90 ml / da	3 gün
Biber (Sera)	Patlıcangillerde Külleme *(Leveillula taurica, Oidium lycopersici, Oidium neolycopersici*)	100 ml / 100 L su	3 gün
Hıyar (Tarla)	Kabakgillerde külleme (*Erysiphe cichoracearum, Podosphaera xanthii)*	75 ml / da	3 gün
Kornişon (Tarla)	Kabakgillerde külleme (*Erysiphe cichoracearum, Podosphaera xanthii)*	75 ml / da	3 gün
Hıyar (Sera)	Kabakgillerde Külleme (*Erysiphe cichoracearum, Podosphaera xanthii)*	80 ml / 100 L su	3 gün
	Kabakgillerde Mildiyö (*Pseudoperonospora cubensis)*	80 ml / 100 L su	3 gün

syngenta

Quadris® Maxx

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	C3:11	G1:3	Fungisit (Mantar ilacı)

200 g/L Azoxystrobin + 125 g/L Difenoconazole

Önce etiketi okuyunuz
Evde kullanmayınız
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.
Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼ 'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Akut oral ve dermal toksisitesi düşük olmasına rağmen uygulama sırasında normal korunma tedbirlerine dikkat edilmelidir. Ciltte tahriş yapabilir.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ :
Genel Tavsiyeler : Syngenta acil durum numarasını, zehir danışma merkezini ya da doktoru ararken ya da tıbbi müdahale alacağınız zaman ürün ambalajını ya da etiketini yanınızda bulundurun.

İÇİNDEKİLER:
Azoxystrobin
Difenoconazole

ZARARLILIK İŞARETLERİ



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ
H302 + H332 Yutulması veya solunması halinde zararlıdır
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın
P304 + P340 + P312 SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Hastayı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise : Tıbbi yardım/müdahale alın.
P391 Dökküntüleri toplayın.
P501 Kabı uygun bir şekilde bertaraf edin

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun

AMBALAJI AÇMADAN ÖNCE EMNİYET TEDBİRLERİNİ OKUYUNUZ

KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Kornişon (Sera)	Kabakgillerde Külleme *(Erysiphe cichoracearum, Podosphaera xanthii)*	80 ml / 100 L su	3 gün
	Kabakgillerde Mildiyö (*Pseudoperonospora cubensis)*		
Bağ*	Bağ Mildiyösü *(Plasmopara viticola)*	80 ml / 100 L su	21 gün
	Bağ Küllemesi *(Erysiphe necator)*		
	Bağda Ölükol *(Phomopsis viticola)*		
Antepfıstığı	Antepfıstığında Karazenk *(Pseudocercospora pistacina)*	100 ml / 100 L su	21 gün
Nar	Kahverengi Leke *(Alternaria alternata)*	80 ml / 100 L su	21 gün
Karpuz	Kabakgillerde Alternaria Yaprak Yanıklığı *(Alternaria cucumerina)*	80 ml / 100 L su	3 gün
Armut	Armut karalekesi (*Venturia pirina*)	75 ml / 100 L su	14 gün
Kavun	Kabakgillerde Alternaria Yaprak Yanıklığı (*Alternaria cucumerina*)	80 ml / 100 L su	3 gün
Zeytin	Halkalı leke hastalığı (*Spilocaea oleginea)*	100 ml / 100 L su	21 gün
Maydanoz**	Yaprağı yenen sebzelerde külleme (Erysiphe spp.)	100 ml / da	14 gün
	Alternaria yaprak lekesi (*Alternaria* spp.)	100 ml / da	14 gün

*** Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.**
****Geçici Kullanım İzni Başvuruları ve Değerlendirme Kriterleri ile Geçici Kullanım İzni Verilen Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsat Kullanım Alanlarının Genişletilmesine Dair Uygulama Talimatı kapsamında, minör kullanım olarak önerilmektedir. Fitotoksisite tam olarak değerlendirilmemiştir. Ürününün geniş çapta uygulanmasından önce kullanıcı sorumluluğunda standart uygulamalar kullanarak küçük bir alanda test edilmesi gerekmektedir.**

Quadris Maxx, hem kontak hem de sistemik etkili bir fungisittir. Bitki üzerinde hem yaprak hem de meyvede üzerinde etkilidir. İçerdiği iki farklı aktif maddenin farklı etkileri sayesinde geniş spekterumlu bir koruma sağlar.

syngenta

Quadris® Maxx

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	C3:11	G1:3	Fungisit (Mantar ilacı)

200 g/l Azoxystrobin + 125 g/l Difenoconazole

Soluma durumunda : Hastayı açık havaya çıkarın. Hastayı rahat ve sıcak bir yerde tutun. Soluma düzensiz veya durmuşsa suni solunum yaptırın. Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine ulaşın.
Deri teması durumunda : Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkarın. Temas eden yerleri bol su ile yıkayın. Deri tahriş olmuşsa doktora başvurun.
Göze teması durumunda : Derhal gözleri, göz kapakları altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lenslerinizi çıkarın. Gerekiyorsa derhal tıbbi yardım alın.
Yutulması durumunda : Derhal tıbbi yardım alın ve ürünün ambalajını ya da etiketini doktora gösterin. Hastayı kusturmaya **ZORLAMAYIN.**

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ :
Belirli bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

KULLANILIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
*Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
*Balıklara zehirlidir, artıkları akarsu, göl, havuz sularına ve çeşme yalaklarına bulaştırmayınız.
*Rüzgarlı havada uygulama yapmayınız.
*Boş ürün ambalajlarını hiçbir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında **3** yıl süre ile ilaç fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:
Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ürünün uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:
Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67 CH-4058
Basel/ İsviçre

ÜRETİM YERİ:
Syngenta Ltd. AFP Plant
Earls Road, Grangemouth FK3 8XG
İngiltere

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:
Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Halkapınar Mah. 1203/11 Sk.
No: 5-7 İç Kapı No: 62
Konak / İzmir
Tel. : (0232) 413 00 55
Faks: (0232) 435 18 85

®=Syngenta Şirketler Topluluğunun tescilli ticari markasıdır

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:
Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. Quadris Maxx, Maydanoz bitkisinde 20-30 litre su/da su normunda kullanılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ :
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ :
Quadris Maxx hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

Domates (Sera), Biber (Sera), Patlıcan (Sera) – Patlıcangillerde Külleme : Uygulamalar çevrede ve serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 12-14 gün ara ile uygulama tekrarlanır. Uygulamalar bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde ve havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır. Patlıcan (Sera)'da bir sezonda ikiden fazla uygulama yapılmaz.
Domates (Tarla), Patlıcan (Tarla) – Patlıcangillerde Külleme : Uygulamalar çevrede ve tarlada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 12-14 gün ara ile uygulama tekrarlanır. Uygulamalar bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde ve havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır.
Domates (Tarla) – Yaprak Küfü: Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilir.
Domates (Tarla) – Septorya Yaprak Lekesi: Hastalığın ilk belirtileri görülür görülmez yeşil aksam ilaçlaması olarak ilaçlamaya başlanmalıdır.
Domates (Tarla), Patates – Erken Yaprak Yanıklığı: Tarlada ilk hastalık belirtileri görülür görülmez uygulamalara başlanmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 12-14 gün ara ile uygulama tekrarlanır.
Hıyar (Sera&Tarla), Kornişon (Sera&Tarla) – Kabakgillerde Külleme : İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır, Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya 12-14 gün ara ile devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 ^{0}C'nin üstünde ve orantılı nemin de %50'nin altında olduğu zamanlarda uygulamalara ara verilmelidir.
Hıyar (Sera) – Kornişon (Sera) Kabakgillerde Mildiyö : İlaçlamaya, hastalık için koşullar uygun olduğunda, serada veya çevrede mildiyönün ilk belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır. Uygulamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekir.
Bağ – Bağ Mildiyö : Tahmin ve uyarı sisteminin uygulanmadığı yörelerde ; ilk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ' ye ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. uygulamanın

syngenta

Quadris® Maxx

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	C3:11	G1:3	Fungisit (Mantar ilacı)

200 g/l Azoxystrobin + 125 g/l Difenoconazole

etki süresi, hastalığın gelişme durumu ve meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile yapılmalıdır. Hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir. Tahmin ve uyarı sisteminin uygulandığı yörelerde ise, 1. uygulama, kışlık sporla tahmini bulaşmadan sonra ve yazlık sporların ortaya çıkmasından önce (ilk yağ lekeleri görülmeden önce) yapılmalıdır. 2. ve diğer uygulamalara, yapraklar üzerinde en az iki saat ıslaklık olduğu ve yapraklarda yağ lekesi bulunduğu sürece devam edilmelidir.

Bağ – Bağ Küllemesi : 1.Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde, 2.Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde 3.Uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde, 4 ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamada kullanılan ilacın etki süresine göre ve tanelere ben düşme dönemine kadar devam edilmelidir.

Bağ – Ölükol: Dormant dönem ilaçlaması: Budamadan sonra, gözler uyanmadan (tomurcuk patlamasından) 3-4 hafta önce dormant dönem uygulaması yapılır.

Yeşil aksam ilaçlaması: Vejetasyon döneminde aşağıdaki programa göre yapılır.
1. İlaçlama: Gözlerin uyanma (Tomurcuk patlaması) başlangıcında,
2. İlaçlama: Sürgünler 8-10 cm uzunluğa ulaştığı dönemde,
3. İlaçlama: Çiçeklenme döneminden hemen önce (çiçek salkımlarının belirdiği dönemde),
4. İlaçlama: Çiçeklenme sonu-tane seti oluşumu başlangıcında yapılmalıdır.

Antepfıstığında Karazenk :
1. Uygulama: Meyveler nohut tanesi iriliğinde ve yapraklar tam olarak açtığı dönemde yapılmalıdır.
2. Uygulama ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun enfeksiyon koşulları devam ettiği sürece 15 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Nar – Kahverengi Leke: 1.Uygulama : Çiçek tomurcukları belirginleşmeye başladığında yapılır. 2. Uygulama : Taç yaprakları döküldüğünde yapılır. 3. Uygulama : Meyveler yarı büyüklüğüne geldiğinde yapılır.

Karpuz ve Kavun – Alternaria Yaprak Yanıklığı : Uygulamalar yeşil aksam uygulaması şeklinde yapılır. Çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamalara başlanır, hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve uygulamanın etkinlik süresi dikkate alınarak 10-12 gün aralıklarla devam edilir.

Zeytin – Halkalı Leke: Marmara Bölgesinde:
1. İlaçlama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce, 2. İlaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılır.

Ege Bölgesinde:
1. ilaçlama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce; 2. ilaçlama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce; 3. ilaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılır. Tüm ilaçlamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.

Akdeniz Bölgesinde:
1. İlaçlama: Hasattan sonra; 2. İlaçlama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce; 3. İlaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılır

Armut – Karaleke: 1. ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında, (Dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır), 2. ilaçlama: Beyaz rozet döneminde, 3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan fungisitlerin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Maydanozda Yaprağı Yenen Sebzelerde Külleme: Hastalığın ilk belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanılmalıdır. Üretim sezonu içerisinde en fazla bir kez kullanılmalıdır.

Maydanozda Alternaria Yaprak Lekesi: Hastalığın ilk belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanılmalıdır. Üretim sezonu içerisinde en fazla bir kez kullanılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
Quadris Maxx isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C3:11 ve G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmalarına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için, Quadris Maxx'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki

syngenta

Quadris® Maxx

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	C3:11	G1:3	Fungisit (Mantar ilacı)

200 g/l Azoxystrobin + 125 g/l Difenoconazole

mekanizmasına sahip (Grup C3:11 ve G1:3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU
Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılamaz