

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Dozu	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Bağ	Bağ küllemesi (<i>Erysiphe necator</i>)	175 ml / 100 L su	21 gün
Hıyar (Sera)	Kabakgillerde külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	175 ml / 100 L su	7 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

ÖZELLİKLERİ VE ETKİ ŞEKLİ:

Tanusella koruyucu ve erken dönem tedavi edici amaçlı kullanılabilen sistemik ve kontakt özellikte bir fungisittir. Penconazole, bitkiler tarafından alınarak fungal patojenin penetrasyonu ve haustorium oluşumu sırasında etkili olur, Kükürt çok yer engelleyici bir fungisit olması nedeniyle hastalık etmenin birden fazla biyolojik dönemine etki etmektedir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :

Önce gerekli olan miktardaki bitki koruma ürününü ayrı bir kaptan az miktar su ile karıştırın. Sonra bu karışımı yarıya kadar su konmuş ilaçlama tankına boşaltın. Karıştırıcıyı da devamlı açık tutarak su seviyesini tamamlayın. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanın ve uygulama bitinceye kadar karıştırıcıyı açık tutun.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ :

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ :

Bağ - Külleme:



Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	M2	G1:3	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	----	------	-------------------------

400 g/l Kükürt + 15 g/l Penconazole

Önce etiketi okuyunuz

Evde kullanmayınız

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey

yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan

sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği

şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI

KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼ 'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ :

Genel Tavsiyeler : Syngenta acil durum numarasını, zehir danışma merkezini ya da doktoru ararken ya da tıbbi müdahale alacağınız zaman ürün ambalajını, etiketini ya da bu Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nu yanınızda bulundurun.

Soluma durumunda : Hastayı açık havaya çıkarın. Hastayı rahat ve sıcak bir yerde tutun. Soluma düzensiz veya durmuşsa suni solunum yaptırın. Derhâl bir doktora veya zehir danışma merkezine ulaşın.

Yutulması durumunda : Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın ve ürünün ambalajını ya da etiketini doktora gösterin. Hastayı kusturmaya ZORLAMAYIN.

Göze teması durumunda : Derhal gözleri, göz kapakları altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lenslerinizi çıkarın. Gerekirse derhal tıbbi yardım alın.

İçindekiler:

Penconazole
Kükürt

ZARARLILIK İŞARETLERİ



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H319 Ciddi göz tahrişine neden olur.

H412 Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için zararlıdır.

ÖNLEM İFADELERİ:

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P264 Elleçlemeden sonra cildi iyice yıkayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P305+P351+P338 – GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa ve yapması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.

P337+P313 – Göz tahrişi devam ederse: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P391 - Döküntüleri toplayın.

P501 - İçeriği / kabı mevcut yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH208 2,2',2''-(Hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)triethanol içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

**AMBALAJI AÇMADAN ÖNCE EMNİYET
TEDBİRLERİNİ OKUYUNUZ
KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ**

DEPOLAMA DURUMU:

- 1. ilaçlama:** Sürgünler 25-30 cm olduğunda
2. ilaçlama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcukları ayrıldığı dönemde
3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları dökülüp koruklar küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde
4. ve diğer ilaçlamalar: 10 gün aralıklarla meteorolojik faktörler ve hastalığın seyri göz önünde bulundurularak tanelere ben düşme zamanına kadar devam etmelidir.

Hıyar (Sera) - Kabakgillerde küllem: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya 10-12 gün arayla devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C'nin üstünde ve orantılı nemin de %50'nin altında olduğu zamanlarda ilaçlamaya ara verilmelidir. Bir sezon içerisinde 4 defadan daha fazla kullanılmamalıdır.

BİTKİ TAHAMMÜLÜ:

Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında, tavsiye edildiği bitkilerce iyi tahammül görür.

Uyarı: Tanusella uygulamaları ile Mineral yağlar ve/veya Captan içerikli bitki koruma ürün uygulamaları arasında en az 3 haftalık bir süre olmalıdır. Nispi nemin % 40'tan düşük, sıcaklığın 35° C üstüne ulaştığı hava koşullarında uygulanması tavsiye edilmez.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Tanusella isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M2 ve G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmalarına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için, **Tanusella**'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M2 ve G1:3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Bir karışıma gereksinim duyulursa ön karışım testi yapılması önerilir. Tanusella Alkali karakterdeki pestisitler (Polisülfidler, Bakır içerikli preparatlar vb.), Mineral yağlar, Folpet ve Captan ile karışıma uyumlu değildir.

syngenta

Tanusella

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	M2	G1:3	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	----	------	-------------------------

400 g/l Kükürt + 15 g/l Penconazole

Deri teması durumunda : Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkarın. Temas eden yerleri bol su ile yıkayın. Deri tahriş olmuşsa doktora başvurun. İlacın bulaştığı giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın.

ANTİDOTU:

Belirli bir antidotu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulanır.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- *Balıklara zehirlidir. Artan miktarı kuyu, havuz, çeşme yalıkları ve akarsulara dökmeyiniz, Sulara bulaştırmaktan kaçınınız.
- *Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.
- *Boş ambalajları başka bir gaye için kullanmayınız, Usulüne uygun olarak imha ediniz.
- *İlaçlı sahada otlatmayın, ot almayın, evcil hayvanları İlaçlı sahadan uzak tutun.
- * Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilaç fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Kullanıcı üretici firmanın kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. Üretici firma ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:

DIACHEM S.p.A.
via Tonale 15, Albano
S. Alessandro 24061 (BG), ITALYA
Phone +39 0363 355611

ÜRETİM YERİ:

DIACHEM S.p.A.
via Mozzanica
9/11 - 24043 Caravaggio (BG) ITALYA

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Halkapınar Mah. 1203/11 Sk.
No: 5-7 İç Kapı No: 62
Konak / İzmir
Tel. : (0232) 413 00 55
Faks: (0232) 435 18 85

®-Syngenta Şirketler Grubunun tescilli ticari markasıdır

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

